

## ATHERINIDAE

*Atherina boyeri* Risso, 1810

## الحُساسِيَّات

FAO names: En – Big-scale sand smelt; Fr – Joël; Sp – Pejerrey mediterráneo;

Ar – حَسَّاس رملِي

**Size:** From 6 to 10 cm TL (13 cm TL).

**Habitat and biology:** Pelagic, neritic, frequently found in brackish waters. Found from the surface down to about 5 m. Gregarious, amphidromous. Feeds on zooplankton, small benthic invertebrates (crustaceans, worms, molluscs) and fish larvae.

**Importance to fisheries:** Target species. Caught commonly to occasionally with seines, lift and cast nets.

**Distribution:** Mediterranean, common in the area. Neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 6–10 سم والأقصى 13 سم.

الموائل وعلم الحياة: بيلاجي، شاطئي، يُشاهدُ مراراً في المياه قليلة الملوحة. يتواجد على أعماق بين السطح و 5 أمتار. سربي. يتنقل باستمرار بين البحر والنهر. يتغذى على العوالق الحيوانية واللافقاريات القاعية الصغيرة كالقشريات والديدان والرخويات ويرقات السمك.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الشباك الجيبية، وشباك الرِّفَع والطرح.

التَّوَرُّع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. يَنْتَشِرُ في مياه الأطلسي المجاورة.

