

CASSIDAE

Cassidaria echinophora (Linnaeus, 1758)

الخوذيات

FAO names: En – Spiny bonnet; Fr – Casque échinophore; Sp – Casco;

Ar – خوذة شوكية

Size: Maximum shell length 11.7 cm.

الحجم: الطول الأقصى للقوقعة 11.7 سم.

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually between 30 and 100 m depth. Carnivorous species, feeds mainly on echinoderms.


الموطن وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 30 و 100 متر. نوع لاصق يتغذى أساساً على شوكيات الجلد.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with bottom trawls and dredges.

الأهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي في شباك الجرف القاعي والمناكش.

Distribution: Mediterranean, occasional in the area. Neighbouring Atlantic.


التوزيع: البحر المتوسط، عرضي في المنطقة. ينتشر في مياه الأطلسي المجاورة.



dorsal view

منظر ظهري

light brown colour with
lighter tubercles
لون بني باهت وتدرجات أبيض لوناً



ventral view

منظر بطني

massive shell
قوقعة ضخمة

thick columellar callus
الجسأة العمودية كثيفة

operculum smaller
than aperture
الغطاء أصغر من الفوهة