

RANELLIDAE

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758)

الودعيّات

FAO names: En – Variegated triton; Fr – Triton émaillé; Sp – Triton;

Ar – تريتون مُرَقَش

Size: Maximum shell length 40 cm.

Habitat and biology: Demersal, over soft and hard bottoms. Found usually between 10 and 50 m depth. Nocturnal. Carnivorous species, feeds mainly on molluscs and echinoderms, particularly seastars.

Importance to fisheries: Bycatch species. Collected occasionally by hand while scuba diving and rarely with dredges and bottom trawls. Commonly used for decoration.


Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area, more common in the eastern part. Neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الأقصى للقوقعة 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 10 و 50 متراً. نوع ليلي لاحم يتغذى أساساً على الرخويات وشوكيات الجلد ولاسيما نجوم البحر.

الأهمية في الصيد: مصيد ثانوي. يُجمع بين الفينة والأخرى باليد أثناء الغطس ونادراً بالمناكش وشباك الجرف القاعي. يشيع استخدامه للتزيين.

التوزُّع: البحر المتوسط، عرضي إلى نادر في المنطقة وأكثر شيوعاً في شرقها. ينتشر في مياه الأطلسي المجاورة.



ventral view

منظر بطني