


Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840


CHLOR Chlor 1

Autres noms scientifiques encore en usage : Aucun.




Noms vernaculaires : FAO : **An** - Shortnose greeneye; **Es** - Ojiverde; **Fr** - Eperlan du large. Nationaux.

Caractères distinctifs : Corps élancé, tête déprimée, museau court, large. Yeux très grands, leur diamètre horizontal plus long que le museau; pupille an forme de goutte d'eau; espace interorbitaire très étroit; mâchoire inférieure dépassant la supérieure et se terminant par une protubérance charnue; maxillaire atteignant en arrière le niveau du centre de l'oeil; dents très petites, coniques, dépressibles, en bandes sur les mâchoires; 19-22 branchiospines aplaties sur la partie antérieure du premier arc branchial. Pas de rayons épineux aux nageoires; dorsale à 10-12 rayons, son origine plus près de l'extrémité du museau que de l'adipeuse; anale à 7-9 rayons; pectorales à 15-17 rayons; pelviennes à 8-9 rayons, insérées sous la dorsale. Ecailles cténoïdes, 50-55 en ligne latérale. Coloration : corps brunâtre ou jaunâtre avec des taches sombres; une ligne sombre à mi-hauteur des flancs; iris vert.



Taille : Maximum: 40 cm; commune de 7 à 15 cm.

Habitat et biologie : Espèce démersale sur le plateau continental et la pente supérieure, sur fond vaseux et argileux, de 50 à plus de 1000 m de profondeur, à des températures de 13° à 4,5°C. Commune au printemps sur des fonds de 350 à 450 m, rare le reste de l'année sur les côtes maghrébines, où il est de plus en plus fréquent d'ouest en est. Serait grégaire. Hermaphrodite. Ponte en juillet-août (Algérie). Jeunes pélagiques près de la surface. Se nourrit d'invertébrés benthiques (crustacés et céphalopodes) qu'il fouille dans les sédiments du fond.




Egalement en Atlantique est, d'Espagne au Sénégal, et ouest, du Cap Cod au Surinam



Pêche et utilisation : Prises accessoires de la pêche semi-industrielle, avec des chaluts de fond. Régulièrement présent sur les marchés d'Espagne, occasionnellement ailleurs, est commercialisé frais ou réfrigéré.

Autres espèces :

Bathypterois dubius Vaillant, 1888 An - Spiderfish
Taille: 21 cm. Benthique de 750 à 1950 m.



Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886) An - Tripodfish
Taille: 30 cm. Benthique de 900 à 3 500 m.



Bathypterois mediterraneus Bauchot, 1962 An - Mediterranean spiderfish
Taille: 19 cm. Benthique de 260 à 2 800 m.

