

CONGRIDAE

Conger conger (Linnaeus, 1758)

الزرقوميات

FAO names: En – European conger; Fr – Congre d'Europe; Sp – Congrio común;

Ar – أنقليس البحر الأوربي

Size: From 70 to 120 cm TL (300 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 70–120 سم والأقصى 300 سم.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found usually from the surface down to 1 200 m depth. Solitary, oceanodromous, reproduces only once in its life with 3 to 8 million eggs deposited at 2 000 to 3 000 m depth. Feeds on fishes, crustaceans, and cephalopods.

الموائل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان القاسية والرخوة. يتواجد عادةً على أعماق بين السطح و 1 200 متر. وحَداني، مهاجر ضمن المحيط. يتكاثر مرة واحدة في حياته حيث يضع 3 إلى 8 مليون بيضة على عمق 2 000 إلى 3 000 متر. يتغذى على الأسماك والقشريات ورأسيات الأرجل.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally with trawls, handlines and longlines.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك الجرف، وبالصيد بالصنابير في عرض البحر، وخيوط الشراك.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Northeastern and neighbouring Atlantic.

التوزيع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة. ينتشر في مياه الأطلسي المجاورة والشمالية الشرقية منه.

