



## SPARIDAE

### *Diplodus sargus sargus* (Linnaeus, 1758)

## الأسبوريات

FAO names: En – White seabream; Fr – Sar commun; Sp – Sargo;

Ar – سرغوس

**Size:** From 15 to 25 cm TL (45 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم والأقصى 45 سم.

**Habitat and biology:** Demersal, neritic, mainly over rocks and hard bottoms. Found usually between 1 and 40 m depth. Gregarious, oceanodromous, juveniles frequently found in brackish waters. Feeds mainly on worms, molluscs, crustaceans, echinoderms.

الموائل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بشكل أساسي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادةً على أعماق بين 1 و 40 متراً. سيربي، مهاجرٌ ضمن المحيط، تُشاهدُ أفرادُه اليافعةً مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على الديدان والرّخويات والقشريات وشوكيات الجلد.

**Importance to fisheries:** Target species. Caught commonly with entangling nets, seines, handlines, longlines, spearfishing and by shore angling.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. شائع في الشباك المُشربكة أو المُبطّنة، والشباك الجيبية، وبالصيد بالصنانيير في عرض البحر، وخيوط الشراك، وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانيير من الشاطئ.

**Distribution:** Mediterranean, common in the area. Eastern Atlantic.

التوزع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. يَنْتَشِرُ في شرقي الأطلسي.

