

MENIPPIDAE

Eriphia verrucosa (Forsskål, 1775)

سرطانات الوحل

FAO names: En – Warty crab; Fr – Crabe verruqueux; Sp – Cangrejo moruno;

Ar – سرطان ثؤلولي

Size: From 5 to 6.5 cm CL (8 cm CL).

Habitat and biology: Demersal, over hard bottoms. Found usually from the surface down to 2 m depth. Feeds mainly on molluscs and polychaetes.

Importance to fisheries: Minor importance. Targeted in Turkey, rarely elsewhere in the area.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring Atlantic.

الحجم: طول الدرقة 5-6.5 سم والأقصى 8 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان صلبة. يتواجد عادة على أعماق بين السطح ومترين. يتغذى أساساً على الرخويات وديدات الأهلاب.

الأهمية في الصيد: ليس له أهمية تُذكر. مُستهدف في تركيا ونادراً في بقية أنحاء المنطقة.

التوزع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة. ينتشر في مياه الأطلسي المجاورة.

unequal strong pincers
ملقطان قويان غير متساويين

transversal granulous ridges behind
frontal margin and on lateral regions
حروف حُبَيْبِيَّة مُسْتَعْرِضَة خَلْف حَاة
الجبهة وعلى المناطق الجانبية

anterolateral margin armed
with 7 spines, of which the
anterior spine spinulate
الحافة الأمامية الجانبية مُسَلَّحَة
بسبع أشواك والشوكة الأمامية
منها تحمل شويكات عدّة

