

TETRAODONTIDAE

Lagocephalus suezensis Clark and Gohar, 1953

رباعيات الأسنان

FAO names: En – Suez puffer;

Ar – أرنب قناة السويس

Size: From 7 to 15 cm TL (18 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 7-15 سم والأقصى 18 سم.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic mainly over soft bottoms. Found usually between 1 and 40 m depth. Inflates by drawing water or air into its body when threatened. Feeds on benthic invertebrates.

الموائل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على قيعان رخوة بشكل أساسي. يتواجد عادةً على أعماق بين 1 و 40 متراً. عندما يستشعر الخطر ينتفخ بسحب الماء أو الهواء إلى جسمه. يتغذى على اللافقاريات القاعية.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught rarely with trawls, handlines and longlines. Poisonous to eat. Dangerous, can bite strongly with its beak.

الأهمية في الصيد: لا أهمية له. مصيد ثانوي. نادر في شباك الجرف، وبالصيد بالصنابير في عرض البحر، وخيوط الثيرك. سام إن أُكِل، وخطِر إذ يُمكن أن يُغضّ بقوة.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional to rare from Egypt to Turkey, not recorded elsewhere in the area. Red Sea.

التوزع: دخل عبر قناة السويس. عرَضِي إلى نادر من مصر إلى تركيا، لم يُسجَل في بقية أنحاء المنطقة. يُنتشر في البحر الأحمر.

