

SPARIDAE

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

الأسبوريات

FAO names: En – Saddled seabream; Fr – Oblade; Sp – Oblada;

Ar – كحلة

Size: From 15 to 20 cm TL (30 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم والأقصى 30 سم.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over hard bottoms and seagrass meadows. Found usually from the surface down to 10 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently found in brackish waters. Feeds mainly on small invertebrates (copepods and other crustaceans).

الموطن وعلم الحياة: بيلاجي شاطئي على قيعان صلبة ومروج الأعشاب البحرية. يتواجد عادةً على أعماق بين السطح و 10 أمتار. سربي، مهاجرٌ ضمن المحيط، يُشاهدُ مراراً في المياه قليلة الملوحة. يتغذى أساساً على اللافقاريات الصغيرة (مِجذافيات الأرجل وقشريات أخرى).

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling nets, seines, handlines, longlines and by shore angling.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. شائع في الشباك المُشربكة أو المُبطنّة، والشباك الجيبية، وبالصيد بالصنابير في عرض البحر، وخيوط الثيراك، وبالصيد بالصنابير من الشاطئ.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Neighbouring and southeastern Atlantic.


التوزع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. يُنتشرُ في مياه الأطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه.



mouth directed upward
الفم متجه للأعلى

half of upper jaw
(internal view)

نصف الفك العلوي
(منظر داخلي)



large black saddle bordered by a white ring
سرج أسود ضخم محاط بخاتم أبيض

