

MUGILIDAE

Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829)

البوريات

FAO names: En – Boxlip mullet; Fr – Mulet labéon; Sp – Caluga;

Ar – بوري أفتس

Size: From 10 to 20 cm TL (30 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 10–20 سم والأقصى 30 سم.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually from the surface down to 10 m depth. Gregarious, close to river and sewage but does not enter brackish waters. Feeds mainly on microscopic organisms.

الموائل وعلم الحياة: بيلاجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادةً على أعماق بين السطح و 10 أمتار. يُشاهد على مقربة من النهر ومياه الصرف الصحي ولكنه لا يدخل المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على الكائنات المجهرية.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with entangling nets, seines, traps, cast nets and by shore angling.

الأهمية في الصيد: نوع مُستهدف في الصيد. عَرَضِي في الشباك المُشْرَبِكة أو المُبْطَنة، والشباك الجيبية والفخاخ وشباك الطرح، وبالصيد بالصنابير من الشاطئ.

Distribution: Southern Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring Atlantic.

التوزع: جَنُوبِي البحر المتوسط، عَرَضِي إلى نادر في المنطقة. يَنْتَشِرُ في مياه الأطلسي المجاورة.

