



OPHICHTHIDAE

Pisodonophis semicinctus (Richardson, 1848)

الثعبانيات

FAO names: En – Atlantic saddled snake-eel;

Ar – مورينا مُرَقَّطَة

Size: From 60 to 70 cm TL (80 cm TL).

الحجم: الطول الكلي 60–70 سم والأقصى 80 سم.

Habitat and biology: Demersal, neritic burrowing in soft bottoms. Found usually between 10 and 30 m depth. Feeds on benthic invertebrates, mainly molluscs and crustaceans.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي يدفن نفسه في القيعان الرخوة. يتواجد عادةً على أعماق بين 10 و 30 متراً. يتغذى على اللاقاريات القاعية ولاسيما الرخويات والقشريات.

Importance to fisheries: None.

الأهمية في الصيد: لا أهمية له.

Distribution: A tropical eastern Atlantic species. Very rare in western part of area, recorded from Tunisia to Morocco. Also recorded from France and the Malta Channel.

التوزيع: ينتشر في المياه المدارية الشرقية في المحيط الأطلسي. شديد الندرة في غربي المنطقة، مسجل من تونس إلى المغرب. مسجل أيضاً من فرنسا وقناة مالطا.

