



## RAJIDAE

*Raja clavata* Linnaeus, 1758

## الليسائيات

FAO names: En – Thornback ray; Fr – Raie bouclée; Sp – Raya de clavos;

Ar – راية مشوكة الظهر

**Size:** From 50 to 75 cm TL (110 cm TL).

**Habitat and biology:** Demersal over soft bottoms, at depths ranging from 10 to 700 m. Oviparous, with 140 to 170 egg-cases per year. Feeds on various benthic animals, particularly crustaceans.

**Importance to fisheries:** Bycatch species. Caught commonly to occasionally with bottom trawls, longlines and entangling nets.

**Distribution:** Mediterranean, common to occasional in the area. Eastern Atlantic and southwestern Indian Ocean.

**الحجم:** الطول الكلي 50–75 سم والأقصى 110 سم.

**الموئل وعلم الحياة:** مجاور للقاع على قيعان رخوة على أعماق تتفاوت ما بين 10 و 700 متر. بيوض، يضع 140 إلى 170 بيضة في العام. يتغذى على حيوانات قاعية مختلفة وخاصة القشريات.

**الأهمية في الصيد:** مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي، وخيوط الشراك، والشباك المشريكة أو المبطنة.

**التوزع:** البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة. ينتشر في شرقي الأطلسي وجنوبي غربي المحيط الهندي.

