

RAJIDAE*Raja montagui* Fowler, 1910**الليسانيات**

FAO names: En – Spotted ray; Fr – Raie douce; Sp – Raya pintada;


Ar – راية مبرقشة

Size: From 40 to 80 cm TL (100 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft and sometimes hard bottoms, at depths ranging from 30 to 100 m (occasionally to 500 m). Oviparous, with 24 to 60 egg-cases per year. Feeds mainly on crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely to occasionally with bottom trawls and longlines.

Distribution: Mediterranean, rare in the northeastern coasts of Africa and in the Levantine basin. Northeastern Atlantic.



frequently large dark spots on middle of hind of pectoral fin
 بقع كبيرة قاتمة متكررة على أواسط مؤخر الزعنفة الصدرية

a regular row of 20–50 thorns from nape to 1st dorsal fin, 1–2 thorns between dorsal fins
 صف منتظم من 20–50 شوكة من مؤخر العنق إلى الزعنفة الظهرية الأولى، شوكة واحدة إلى شوكتين بين الزعنفتين الظهريتين

الحجم: الطول الكلي 40–80 سم والأقصى 100 سم.

الموطن وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة وبعض الأحيان على قيعان صلبة على أعماق تتفاوت ما بين 30 و 100 متر (وعرضياً على عمق 500 متر). بيوض، يصنع 24 إلى 60 بيضة في العام. يتغذى أساساً على القشريات.

الأهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر إلى عرضي في شباك الجرف القاعي، وخبوط الشراك.

التوزيع: البحر المتوسط، نادر في السواحل الشمالية الشرقية لأفريقيا وفي الحوض الشرقي للمتوسط (الليفانت). ينتشر في شمالي شرقي الأطلسي.