



STROMATEIDAE

Stromateus fiatola Linnaeus, 1758

المرقعات

FAO names: En – Blue butterflyfish; Fr – Fiatole; Sp – Palometa fiatola;

Ar – زبيدة

Size: From 25 to 35 cm TL (55 cm TL).

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually between 10 and 70 m depth. Gregarious, juveniles found with jellyfishes. Feeds on small fishes, jellyfishes and other zooplankton.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, entangling nets and seines.

Distribution: Mediterranean, occasional from Morocco to Algeria, rare to absent elsewhere in the area. Neighbouring and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 25–35 سم والأقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيلاجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادةً على أعماق بين 10 و 70 متراً. سربي، تظهر الأفراد اليافعة مع قناديل البحر. يتغذى على الأسماك الصغيرة وقناديل البحر والعوالق الحيوانية.

الأهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرَضِي في شباك الجرف، والشباك الجيبية.

التوزع: البحر المتوسط، عرضي من المغرب إلى الجزائر، نادر إلى غائب في بقية أنحاء المنطقة. يتنشر في مياه الأطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه.

