

## TRACHINIDAE

*Trachinus araneus* Cuvier, 1829

## الأسماك الخشنة

FAO names: En – Spotted weever; Fr – Vive-araignée; Sp – Araña;

Ar – بلم مُرَقَط

**Size:** From 10 to 30 cm TL (50 cm TL).

**Habitat and biology:** Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually between 5 and 100 m depth. Feeds on small fishes and crustaceans.

**Importance to fisheries:** Bycatch species. Caught occasionally with trawls, entangling nets, handlines and longlines. Venomous, can inflict painful stings from spines present on first dorsal fin and operculum.

**Distribution:** Mediterranean, common to occasional in the area. Northeastern and neighbouring Atlantic.

**الحجم:** الطول الكلي 10–30 سم والأقصى 50 سم.

**الموطن وعلم الحياة:** مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادةً على أعماق بين 5 و 100 متر. يتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات.

**الأهمية في الصيد:** مصيد ثانوي. عَرَضِي في شباك الجرف، والشباك المُشْرِبِكة أو المُبَطَّنة، وبالصيد بالصنانيير في عرض البحر، وخيوط الشراك. سامٌّ، يُمكنُ أن يسبب لدغات مؤلمة بواسطة أشواك في الزعنفة الظهرية الأولى وغطاء الغلاصم.

**التَّوَرُّع:** البحر المتوسط، شائع إلى عَرَضِي في المنطقة. يَنْتَشِرُ في مياه الأطلسي المجاورة والشمالية الشرقية منه.

distance between eyes equal to eye diameter  
المسافة بين العينين تساوي قطر العين

2 spines  
شوكتان

black blotches  
لطخات سوداء

